

家住海邊

Living by the sea Terns in Taiwan


臺灣的燕鷗

阿拉善SEE 聯合會 聯合主辦 臺北市野鳥學會 聯合主辦
台灣自然中心 聯合主辦 臺灣野鳥學會 聯合主辦
Wild Bird Society of Taipei
繪圖 / 李政霖
2024年5月發行

賞燕鷗的時節

到臺灣的燕鷗生息狀態十分多樣，依來訪的季節以及停留的時間長短，可區分為全年在此棲息並繁殖的「留鳥」^留、夏天（5-8月）來繁殖的「夏候鳥」^夏、冬天（10-2月）來度冬的「冬候鳥」^冬及短暫停留的「過境鳥」^過。

賞燕鷗的地點



賞鳥注意事項

- * 盡量保持安靜，不要驚嚇到鳥兒。
- * 絕不追逐任何鳥兒（尤其是稀有鳥種），讓牠們能自在覓食與休息。
- * 絕不用任何不當的方法（如投擲石頭、播放鳥音、餵食）驅趕或引誘鳥兒以觀賞或攝影。
- * 看到孵蛋或育雛中的鳥巢，保持距離、安靜觀察，避免親鳥受到過度干擾，棄巢而去。
- * 除了足跡，什麼都不留；除了攝影，什麼都不取。

玄燕鷗 ^夏

英名 Brown Noddy
學名 *Anous stolidus*

- 嘴黑色、上嘴先端略下彎。腳黑褐色。全身暗褐色，前額銀灰色、頭頂至後頸淡灰色。有不完全白眼圈。
- 叫聲為粗啞的「kark-kark-」。
- 活動於熱帶、亞熱帶海洋中小型島嶼或礁岩。



小燕鷗 ^留^夏

英名 Little Tern
學名 *Sternula albifrons*


- 繁殖期嘴黃色、先端黑，腳黃色，前額白呈三角形。非繁殖期嘴黑，腳暗黃至黑褐色，前額白色範圍擴及頭頂。
- 叫聲為尖銳的「ki-ki-」。
- 活動於海岸、河口、魚塢。



烏領燕鷗 ^夏^過

英名 Sooty Tern
學名 *Onychoprion fuscatus*


- 嘴黑色。腳黑色。前額有白色帶延伸至眼上，背、翼至尾羽為黑褐色，臉、頸側與體下為白色。
- 叫聲為鼻音重的「wideawake-」。
- 活動於熱帶、亞熱帶海洋中的小型島嶼或海岸礁岩。



白眉燕鷗 ^夏

英名 Bridled Tern
學名 *Onychoprion anaethetus*

- 嘴黑色。腳黑色。前額有白色帶延伸過眼後，背、翼至尾羽為暗灰褐色，臉、頸側與體下為白色。
- 叫聲為鼻音重的「kurwa-kurwa-」。
- 活動於熱帶、亞熱帶海洋中的小型島嶼或海岸礁岩。



白腰燕鷗 ^過

英名 Aleutian Tern
學名 *Onychoprion aleuticus*


- 嘴黑色。腳黑色。繁殖期前額白色呈三角形，肩、背與翼為深灰色。臉頰、腰與尾羽白色。非繁殖期頭頂轉白，頸與體下亦轉白。
- 叫聲為尖銳的「kirr-kirr-」。
- 活動於熱帶、亞熱帶海洋中的小型島嶼或海岸礁岩。



燕鷗 ^過

英名 Common Tern
學名 *Sterna hirundo*

- *longipennis* 亞種嘴、腳黑色。*hirundo / tibetana* 亞種嘴紅色、先端黑色，腳紅色。繁殖期前額、眼上至頭頂與後頸黑色。非繁殖期前額轉白，夾雜暗色斑紋。
- 叫聲為吵雜尖銳的「deerar-」。
- 活動於近海小型島嶼或海岸礁岩，也會進入內陸河口、沼澤、魚塢。



紅燕鷗 ^夏

英名 Roseate Tern
學名 *Sterna dougallii*

- 嘴黑色，繁殖期轉粉紅、先端黑，至繁殖晚期嘴全紅。腳紅色。*bangsii* 亞種繁殖期前額、眼上至頭頂、後頸黑色，頰、頸、體下白色略帶粉紅色。非繁殖期前額轉白色，體下白。
- 叫聲為輕快的「chew-it-」。
- 活動於近海小型島嶼、海岸礁岩與沙洲、灘地。



蒼燕鷗 ^夏

英名 Black-naped Tern
學名 *Sterna sumatrana*

- 嘴黑細長、尖端有細小白斑。腳黑褐色。*sumatrana* 亞種繁殖期全身大致白色，體下略帶粉紅色，黑色過眼線延伸至後頸。
- 叫聲為尖銳的「grri-」。
- 活動於近海小型島嶼或海岸礁岩。



鳳頭燕鷗 ^夏

英名 Great Crested Tern
學名 *Thalasseus bergii*

- 嘴黃色、先端較淡。腳黑色。*cristatus* 亞種繁殖期前額白色，眼上至頭後黑色，頭後有像魔克頭的短羽冠。肩、背與翼上暗棕灰色。非繁殖期前額白色擴大至頭頂，夾雜黑色細縱紋。
- 叫聲為粗啞嘹亮的「kirrick-」。
- 活動於近海小型島嶼，在河口沙洲群集或覓食。



黑嘴端鳳頭燕鷗 ^夏^過

英名 Chinese Crested Tern
學名 *Thalasseus bernsteini*

- 嘴橙黃色、先端黑、嘴尖白。腳黑色。繁殖期前額、眼上至頭後黑色，頭後有像魔克頭的短羽冠。肩、背與翼上淡灰色。非繁殖期前額白色擴大至頭頂，夾雜黑色細縱紋。
- 叫聲為高亢嘹亮的「kirrick-」。
- 活動於近海小型島嶼，也出現在海邊、河口沙洲。
- 曾經被認為滅絕卻又再度現身，目前全球僅存約200隻，因此有神話之鳥的美名。



裏海燕鷗 ^冬

英名 Caspian Tern
學名 *Hydroprogne caspia*

- 嘴紅粗厚、先端黑。腳黑色。繁殖期前額、眼上至頭後黑色，頭後有不明顯羽冠。非繁殖期頭上轉白，並有細密黑縱紋。
- 叫聲為粗啞的「kyaaa-」。
- 活動於海岸、河口、魚塢。



鷗嘴燕鷗 ^冬^過

英名 Gull-billed Tern
學名 *Gelochelidon nilotica*


- 嘴黑短厚。腳黑色。*affinis* 亞種繁殖期前額、頭頂至後頸黑色。非繁殖期頭上轉白，眼後有一黑點斑。
- 叫聲為鼻音重的「wee-wee-」。
- 活動於海岸潮間帶、河口、近海魚塢。



白翅黑燕鷗 ^冬^過

英名 White-winged Tern
學名 *Chlidonias leucopterus*

- 嘴黑色。腳深紅色。繁殖期頭、頸、胸、腹及翼下覆羽黑色，背暗灰。非繁殖期前額至頭頂轉白，頭後黑色不與背相連，眼後有黑斑延伸過眼下。
- 叫聲為喉音的「kwek-」。
- 活動於河口、魚塢、草澤、湖泊。



黑腹燕鷗 ^冬^過

英名 Whiskered Tern
學名 *Chlidonias hybrida*

- 嘴暗紅色。腳深紅色。*hybrida* 亞種繁殖期前額、眼上至頭頂與後頸黑色。非繁殖期前額至頭頂轉白，並夾雜黑色細斑。
- 叫聲為尖細的「kit-kit-」。
- 活動於河口、魚塢、草澤、湖泊。





蒼燕鷗
Black-naped Tern



小燕鷗
Little Tern



裏海燕鷗
Caspian Tern



紅燕鷗
Roseate Tern



鷗嘴燕鷗
Gull-billed Tern



黑嘴端鳳頭燕鷗
Chinese Crested Tern

家 Living by the sea 住 Terns in Taiwan 臺灣的燕鷗

燕鷗屬於中至大型海鳥，雌雄同型，羽色多為白色與灰色的濃淡深淺組合，嘴喙比其他鷗科鳥類長，腳上有蹼，翅膀為狹長型，尾羽有分叉如同燕子一般，所以稱為燕鷗。喜愛生活於島嶼、礁岩、海岸地帶，以魚為主食，也吃甲殼類、雛鳥等。一夫一妻制，多在地面營巢。



白腰燕鷗
Aleutian Tern



燕鷗
Common Tern



鳳頭燕鷗
Great Crested Tern




黑腹燕鷗
Whiskered Tern



烏領燕鷗
Sooty Tern



白翅黑燕鷗
White-winged Tern



白眉燕鷗
Bridled Tern



玄燕鷗
Brown Noddy

